

Labor Alsergrund Schwarzspanierstr. 15 A-1090 Wien T +43/1/402 23 67 F +43/1/403 65 74	Labor Donauzentrum Donaustadtstr. 1 A-1220 Wien T +43/1/203 32 13 F +43/1/203 81 64	Labor Favoriten Otto-Probst-Str. 22-24 A-1100 Wien T +43/1/615 06 10 F +43/1/615 06 10-205	Labor Hernals Rosensteing. 49 A-1170 Wien T +43/1/485 61 61 F +43/1/485 77 15-32	Labor Margareten Stolbergg. 44 A-1050 Wien T +43/1/545 31 82 F +43/1/545 31 82-200	Labor Neubau Mariahilfer Str. 82 A-1070 Wien T +43/1/523 51 51 F +43/1/523 85 97-21	Labor Oberwart Steinamangererstr. 16 A-7400 Oberwart T +43/3352/38 3 71 F +43/3352/38 3 72	Labor Wöhring Gymnasiumstr. 39 A-1180 Wien T +43/1/478 34 41 F +43/1/478 34 42
--	---	--	--	--	---	--	--

### Verteiler:

Privatkliniken –  
Ärztliche Direktion und Labors

Wien, 06.06.2016

## Aktuelle Information

Sehr geehrte Frau Kollegin! Sehr geehrter Herr Kollege!

Wie wir von unserem Reagenzhersteller Fa. Beckman Coulter erfahren haben, besteht die Möglichkeit, dass es bei der direkten Verabreichung von Metamizol (in Österreich nur als Präparat Nolvalgin vertrieben) vor oder während der Blutabnahme zu falsch niedrigen Werten bei folgenden Parametern kommt:

- Cholesterin
- HDL-Cholesterin
- Triglyceride
- Harnsäure
- Lactat
- Lipase

Prinzipiell und ebenso speziell, empfehlen wir daher, Infusionen oder Medikamentengaben stets **nach** der morgendlichen Blutabnahme zu verabreichen, um jegliche Interaktionen zu vermeiden.

Mit kollegialen Grüßen

Ihr Labor IMCL



Dr. Renée Tauffer  
Geschäftsführerin